

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ХЕЛИКАФ

Торговое название: Хеликаф

Действующее вещество (МНН): Сухой экстракт листьев плюща.

Форма выпуска: Сироп для приема внутрь.

Состав:

Активное вещество: плюща листьев экстракт сухой - 7,0 мг;

Вспомогательные вещества: лимонная кислота безводная, натрия сахарин, калия сорбат, сорбитол, ментол, вода для инъекций до 1 мл.

Описание: сироп светло-коричневого цвета, слегка мутный с характерным запахом и вкусом

Фармакотерапевтическая группа: Отхаркивающее средство

Код АТХ: R05CA

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Хеликаф – лекарственное средство растительного происхождения, представляет собой сухой экстракт листьев плюща. Действие препарата Хеликаф обусловлено присутствием в экстракте листьев плюща сапонинов, представленных стероидным гликозидом гедеракозидом С, в результате гидролиза которого образуется альфа-гедерин, который и является основным действующим соединением экстракта плюща. Оказывает отхаркивающее, муколитическое действие и спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру бронхов. Снижает вязкость мокроты и способствует её отхождению.

При непродуктивном (сухом) кашле Хеликаф способствует разжижению вязкой мокроты, облегчает ее отхождение. При продуктивном (влажном) кашле сироп Хеликаф облегчает отхаркивание и выведение мокроты. Благодаря освобождению дыхательных путей от мокроты способствует улучшению дыхания, уменьшению и исчезновению кашля.

Фармакокинетика

Поскольку препарат представляет собой сухой экстракт листьев плюща и содержит комплекс биологически активных веществ, проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению

В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Способ применения и дозы

Внутрь. Перед употреблением взбалтывать.

Грудным и маленьким детям, сироп Хеликаф рекомендуется давать разбавленным в небольшом количестве воды.

Дети до 1 года 2,5 мл сиропа (1/2 юнидозы) 2 раза в день

Дети от 1 года до 6 лет 2,5 мл сиропа (1/2 юнидозы) 3 раза в день.

Дети от 6 до 12 лет 5 мл сиропа (1 юнидоза) 3 раза в день.

для взрослых и подростков в 5-7,5 мл сиропа (1-1,5 юнидозы) 3 раза в день.
возрасте старше 12 лет

Курс лечения определяется тяжестью заболевания, минимальный курс лечения должен составлять 1 неделю.

Для закрепления терапевтического эффекта рекомендуется после исчезновения симптомов болезни продолжить лечение еще в течение 2-3 дней. При отсутствии улучшения состояния необходимо обратиться к врачу.

В период лечения препаратом Хеликаф, рекомендуется употреблять достаточное количество жидкости.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Очень редко при применении препарата может наблюдаться слабительный эффект (вследствие содержания сорбитола).

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- наследственная непереносимость фруктозы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными препаратами центрального действия (например, кодеином или декстрометорфаном), так как последние затрудняют отхождение мокроты.

В связи с содержанием сапонинов препарат может потенцировать действие других средств, раздражающих слизистую оболочку желудка.

Особые указания

Хеликаф сироп от кашля не содержит спирта, сахара и красителей, его могут принимать пациенты с аллергическими реакциями на красители, больные сахарным диабетом, а также пациенты, которые должны избегать применения алкоголя или алкоголь-содержащих препаратов.

Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в 5 мл препарата Хеликаф содержится 1,225 г сорбитола, что соответствует 0,10 ХЕ.

Не рекомендуется применять сироп Хеликаф с другими препаратами, которые подавляют кашель (противокашлевыми препаратами, такими как кодеин или декстрометорфан), так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

В процессе хранения возможно легкое помутнение сиропа/выпадение осадка и незначительные изменения вкуса, что не влияет на терапевтическое действие препарата.

Перед употреблением взбалтывать!

Не следует принимать препарат в дозах, превышающих рекомендованные в инструкции.

При заболеваниях органов дыхания, сопровождающихся затруднённым дыханием, лихорадкой, длительным кашлем или мокротой с примесью крови, необходимо немедленно обратиться к врачу.

При отсутствии эффекта на фоне лечения препаратом и ухудшении состояния необходимо обратиться к врачу.

Беременность и период лактации

Исследования по безопасности применения препарата у беременных женщин и у женщин, кормящих грудью, не проводились. При необходимости применения препарата Хеликаф при беременности следует соотнести предполагаемую пользу для матери и потенциальный риск для плода. Следует соблюдать осторожность при назначении препарата в период грудного вскармливания.

Влияние на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Нет данных о влиянии препарата Хеликаф, на способность управлять транспортными средствами и работу с техническими устройствами, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работу с техническими устройствами, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Передозировка

Прием препарата в больших дозах (в три раза превышающих рекомендованную суточную дозу), может вызывать тошноту, рвоту и диарею, что объясняется содержанием в препарате сапонинов.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Форма выпуска

Сироп в юнидозах (ампулах) из полиэтилена или полипропилена, по 5 мл. По 10 юнидоз, в картонной пачке вместе с инструкцией по применению.

Срок годности

2 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C в недоступном для детей месте. Не замораживать.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта врача.

Производитель

СП ООО "Jurabek Laboratories"

Республика Узбекистан, 100003, г. Ташкент, ул. Алмазар 165,

тел/факс: (99878) 1500303 Web:www.jurabek.uz