

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ**

### **Спирт этиловый медицинский 70 %**

**Торговое название препарата:** Спирт этиловый медицинский 70 %.

**Действующее вещество (МНН):** Этанол.

**Лекарственная форма:** Раствор для наружного применения.

**Состав:**

*Активное вещество:* Спирт этиловый медицинский 96 %-665,5 г;

*Вспомогательное вещество:* Вода очищенная -334,5 г.

**Описание:** Прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** Антисептические и дезинфицирующие средства.

**Код АТХ:** D08AX

#### **Фармакологические свойства**

При наружном применении этиловый спирт оказывает антисептическое раздражающее действие. При этом 40% раствор приостанавливает размножение, а 70 % раствор полностью прекращает жизнедеятельность микроорганизмов. К тому же в этой концентрации этиловый спирт проникает в глубокие слои эпидермиса, где часто накапливается патогенная микрофлора. Поэтому для обеззараживания кожи применяется 70% раствор этилового спирта.

Вызываемое этиловым спиртом раздражающее действие обуславливают возникновение рефлексов кожных рецепторов, приводящих к восстановлению нормального кровенаполнения органов, связанных с раздражаемой рефлексогенной зоной. При раздражении больших кожных поверхностей наступает рефлекторное возбуждение дыхания и подъем артериального давления, а так же учащение ритма сердечных сокращений. Для получения раздражающего действия обычно применяют 40% раствор этилового спирта.

#### **Показания к применению**

Для антисептической обработки кожи (рук хирурга, операционного поля, мест инъекций, небольших кожных ран и ссадин, юношеских и иных кожных угрей и т.п.), нормализации кровенаполнения мягких тканей и внутренних органов при ушибах, простудных заболеваниях, мигрени и др; для приготовления настоек.

#### **Способ применения и дозы**

Антисептической обработка кожи производится неразбавленным препаратом. Для получения раздражающего эффекта препарата разбавляют дистиллированной или кипяченой водой в соотношении 4 объема препарата и 3 объема воды. Полученным 40 % раствором производят растирания или накладывают компрессы. При бронхитах и воспалении легких компрессы накладывают на спину и грудь, при мигрени и насморке - на ступни ног, при ушибах - на ушибленное место.

#### **Побочные действия**

При поврежденном кожном покрове на месте нанесения препарата ощущается жжение, которое самостоятельно проходит через несколько минут.

#### **Противопоказания**

Не следует накладывать компрессы на участки с обширным повреждением кожи.

#### **Особые указания**

Не следует накладывать компрессы на участки с обширным повреждением кожи.

**Форма выпуска**

Флаконы по 50 мл и 100 мл.

**Условия хранения**

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

**Срок годности**

Не ограничен.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель:**

**СП ООО "JurabekLaboratories"**

Республика Узбекистан, 100003, г. Ташкент, ул. Алмазар 165,

тел/факс: (99878) 1500303

Web: [www.jurabek.uz](http://www.jurabek.uz)