

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Биологически активная добавка к пище
«Стронгиум цинк»

Торговое название: Стронгиум цинк

Форма выпуска: Раствор для приёма внутрь, в юнидозах (ампулах) из полиэтилена медицинского по 5мл (содержит 5 мг цинка) и 10 мл (содержит 10 мг цинка)

Общая характеристика: прозрачный, слегка желтоватый раствор.

Состав:

Активное вещество: Цинка сульфата моногидрата - 13,75 мг или 27,5 мг что соответствует цинку - 5,0 мг/5 мл или 10,0 мг/10 мл

Вспомогательные вещества: натрия сахаринат, метилпарагидроксибензоат, ароматизатор банан, вода для инъекций до 5 мл или до 10 мл

Свойства:

Цинк (Zn) является микроэлементом, который входит в состав более 300 гормонов и ферментов в организме человека и принимает участие во всех жизненно важных процессах. В организме человека цинк содержится в клетках, мышцах, коже, волосах, тканях костей и мужских яичках. Цинк оказывает следующее влияние на ряд органов и систем: стимулирует работу иммунной системы, принимает участие в росте и формировании костной системы, соединительной ткани и клеток организма, улучшает процессы регенерации кожных покровов, стимулирует рост волос и ногтей, поддерживает их в хорошем состоянии, активизирует белковый, жировой и углеводный обмены, цинк необходим для секреции, продуцирования и утилизации инсулина, принимающего участие в обмене углеводов, принимает участие в процессах обмена, которые происходят в надпочечниках, щитовидной железе, гипофизе, яичниках и семенниках, оказывает влияние на формирование мужских половых гормонов и улучшает функциональное состояние предстательной железы, обеспечивает прозрачность хрусталика глаза и стабильность сетчатки, является преобладающим минеральным веществом в структуре глаза, улучшает всасывание, регулирует обмен витамина А в организме, способствует нормальной работе печени, необходим для правильного функционирования вкусовых и обонятельных рецепторов, поддерживает и улучшает память.

Применение:

Стронгиум цинк рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник цинка, т.к. в организме отсутствует депо цинка, поэтому недостаточное поступление цинка с пищей может привести к появлению его дефицита.

Применение биодобавки Стронгиум цинк рекомендуется при наличии риска усиленного выделения цинка из организма при курении или злоупотреблении алкоголем, интенсивных занятиях спортом.

Рекомендации по употреблению:

Стронгиум цинк принимают во время или после еды, непосредственно в чистом виде, либо разбавив содержимое юнидозы питьевой водой. Следует слегка взболтать содержимое юнидозы перед применением.

	Суточная доза для профилактики дефицита цинка	Суточная доза для устранения дефицита цинка
Взрослые	10 мг	От 20 мг до 40 мг
Дети от 2 мес до 17 лет	5 мг	10 мг
Детям до 2 месяцев	2,5 мг	5 мг

Продолжительность приема- 1 месяц. Повторный прием 2-3 раза в год.

Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Не превышать рекомендуемую суточную дозу без консультации врача!

При пропущенных приемах препарата, недостающая доза может быть принята как можно скорее, но не раньше 6 часов до последующего применения. Если к этому моменту подошло время принятия следующей дозы - не принимать пропущенную дозу.

Не рекомендуется принимать Стронгиум цинк одновременно с кофе или чаем, так как они препятствуют всасыванию цинка.

Стронгиум цинк БАД не совместим с употреблением спиртных напитков.

Противопоказания:

- Индивидуальная непереносимость активного или вспомогательного компонента продукта;

Принимать по согласованию с врачом: при беременности, при лактации, при заболеваниях почек, при активных аутоиммунных процессах, при тяжелых аллергических реакциях, при одновременном приеме других цинксодержащих препаратов.

Побочные действия

Биологически активная добавка в редких случаях может вызывать аллергическую реакцию на какой-либо компонент, находящийся в составе.

При превышении рекомендованных доз или вследствие передозировки цинка могут наблюдаться: металлический привкус во рту, головная боль, диспепсические расстройства.

В случае возникновения вышеуказанных симптомов следует прекратить применение препарата и немедленно обратиться к врачу.

Предупреждения

БАД, не является лекарственным средством!

Диета, богатая фосфатами (например, молочные продукты), зерновые хлебобулочные изделия или овощи - ограничивают всасывание цинка путем связывания в невсасываемые комплексы; такого рода пища может приниматься не менее чем через 2 часа после применения Стронгиум Цинк.

При длительном применении препаратов цинка следует учитывать вероятность возникновения дефицита ионов меди в организме.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Срок годности

2 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Производитель

СП ООО "Jurabek Laboratories"

Республика Узбекистан, 100003, г. Ташкент, ул. Алмазар 165,

тел/факс: (99878) 1500303

Web:www.jurabek.uz