

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ СУЛЬФОКАМФОКАИН

**Торговое название препарата:** Сульфокамфокаин

**Действующее вещество (МНН):** сульфокамфорная кислота + прокаин

**Лекарственная форма:** раствор для инъекций.

**Описание:** прозрачный бесцветный или слегка желтоватый раствор.

**Состав:**

*активные вещества:* кислоты сульфокамфорной, в пересчете на безводную - 49,6 мг  
прокаина - 50,4 мг

*вспомогательные вещества:* вода для инъекций до 1 мл.

**Фармакотерапевтическая группа:** аналептическое средство

**Код АТХ:** R07AB

### **Фармакологические свойства**

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат, оказывает аналептическое действие. Стимулирует дыхательный и сосудодвигательные центры продолговатого мозга. Оказывает прямое действие на миокард, усиливая в нем обменные процессы, улучшая функции и повышая его чувствительность к симпатической импульсации. Повышает тонус периферических кровеносных сосудов. Улучшает легочную вентиляцию, легочный кровоток. В связи с растворимостью в воде препарат быстро всасывается при подкожном и внутримышечном введении. Не вызывает образования инфильтратов и осложнений (олеом). Возможно внутривенное введение.

#### **Фармакокинетика**

*Всасывание.* Препарат Сульфокамфокаин быстро всасывается при подкожном, внутримышечном, внутривенном введении.

*Метаболизм.* В организме в процессе метаболизма подвергается окислению и конъюгации с глюкуроновой кислотой.

*Выведение.* Метаболиты выделяются в основном почками, при этом моча имеет запах препарата. Частично выводится с выдыхаемым воздухом, через дыхательные пути, и с желчью.

### **Показания к применению**

- ✓ острая и хроническая сердечная недостаточность;
- ✓ острая и хроническая дыхательная недостаточность;
- ✓ кардиогенный и анафилактический шок.

### **Способ применения и дозы**

Сульфокамфокаин применяют подкожно, внутримышечно или внутривенно по 2 мл 10 % раствора (0,2 г); при необходимости кратность введения составляет до 2-3 раз в сутки. Максимальная суточная доза для взрослых 12 мл 10 % раствора (1,2 г).

В острых случаях препарат вводят внутривенно (медленно струйно или капельно) в разовой дозе 2 мл 10 % раствора.

Длительность применения устанавливают индивидуально.

При хронической дыхательной и сердечной недостаточности вводят подкожно или внутримышечно в течение 20-30 дней.

*Дети.* Препарат не применяют у детей.

### **Побочное действие**

*Со стороны ЖКТ:* диспепсические расстройства.

*Со стороны нервной системы:* головная боль, головокружение, тремор, парестезии, судороги.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* снижение или повышение АД, сердцебиение, боль в грудной клетке.

*Со стороны системы крови и лимфатической системы:* метгемоглобинемия.

*Со стороны иммунной системы:* реакции гиперчувствительности, в том числе ангионевротический отек, анафилактический шок, кожные высыпания, зуд, гиперемия, крапивница.

*Общие нарушения и реакции в месте введения:* гиперемия, высыпания и зуд в месте инъекции.

*Прочие:* лихорадка, непроизвольное мочеиспускание.

### **Противопоказания**

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата (в том числе к новокаину).
  - Эпилепсия, склонность к судорожным состояниям.
- С осторожностью:*** артериальная гипотензия.

### **Лекарственные взаимодействия**

При одновременном применении с другими лекарственными средствами возможно:

- с препаратами, угнетающими ЦНС, — ослабление действия последних;
- с антихолинэстеразными средствами — ослабление действия последних;
- с суксаметонием — пролонгация нервно-мышечной блокады, вызванная суксаметонием;
- с ингибиторами МАО — повышение риска АГ;
- с сердечными гликозидами, мочегонными средствами, анальгетиками, стероидными гормонами — усиление аналептического действия сульфокамфокаина.

Препарат иногда назначают для уменьшения выраженности побочных эффектов при проведении химиотерапии флуороурацилом.

Во время применения препарата не рекомендуется употреблять алкоголь.

### **Особые указания**

Следует соблюдать осторожность при введении препарата больным с низким артериальным давлением в связи с возможностью развития гипотензивного действия новокаина, высвобождающегося в организме из сульфокамфокаина. Возможно снижение артериального давления (особенно у пациентов с исходной артериальной гипотензией).

*Применение при беременности и в период лактации*

Ввиду отсутствия данных по применению сульфокамфокаина при беременности и в период грудного вскармливания, его применение в эти периоды не рекомендуется.

*Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами*

Во время лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с механизмами, а в случае возникновения головокружения, судорог воздержаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций

### **Передозировка**

*Симптомы:*

- при значительном превышении рекомендованных доз возможны: головокружение, головная боль;

- при остром отравлении – двигательное беспокойство, покраснение лица, эпилептиформные судороги, бред.  
*Лечение:* при передозировке назначают антипсихотические, противосудорожные средства (в зависимости от основного синдрома). При невыраженном психомоторном возбуждении используют транквилизаторы, успокоительные средства.

**Форма выпуска**

По 2 мл в ампулы из стекла или полиэтилена медицинского. Ампулы вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

**Условия хранения**

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 С.  
Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года.

Не использовать по истечении срока годности; указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

По рецепту врача.

**Производитель:**

СП ООО "Jurabek Laboratories"

**Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:**

СП ООО "Jurabek Laboratories"

Республика Узбекистан, 100003, г. Ташкент, ул. Алмазар 165,

тел/факс: (99878) 1500303

Web: [www.jurabek.uz](http://www.jurabek.uz)